


# 渡り鳥のシーズン到来

## 中国で10月 H5N6 高病原性鳥インフルエンザ続発！！

その他、台湾・フランスなどの海外において、鳥インフルエンザが発生しています。

※発生地域への渡航の自粛をお願いいたします！

### 中国における高病原性鳥インフルエンザの発生状況(2015年1月～)



### 引き続き飼養衛生管理基準の遵守をお願いいたします

下記項目を特に今一度ご確認ください

- ・衛生管理区域の設定
- ・踏込消毒槽
- ・車両消毒徹底
- ・防鳥ネットの設置・補修
- ・ネズミの侵入防止、駆除の徹底
- ・新鮮な水道水の使用

飼養衛生管理基準の遵守状況を巡回点検中です



異常を認めた場合は、すぐに家畜保健衛生所へ連絡してください

0574-25-3111

●閉庁時は案内に従い「1」番をプッシュしてください  
 つながらない場合は **0574-25-3484** へ  
 土日・祝日、閉庁時も通報を受け付けます

中濃家畜保健衛生所

TEL 0574-25-3111 FAX 0574-27-3092

# 高病原性鳥インフルエンザの発生を防止するために



←高病原性鳥インフルエンザウイルス




- (1) 人・車輛等による侵入の防止
- (2) 野鳥・野生動物による侵入の防止
- (3) 飲用水、飼料の汚染による侵入の防止
- (4) 鶏舎内外の整理・整頓・清掃



(5) 鶏の健康管理  
及び取扱い

(6) 鶏糞の処理  
病原体の散逸防止



早期発見  
早期通報

高病原性鳥インフルエンザが  
疑われる場合には直ちに  
家畜保健衛生所や獣医師に  
連絡してください

(7) 鳥インフルエンザに  
対する理解と教育

鶏舎、農場敷地周縁に2~3m幅で  
消石灰を散布しましょう



2~3m

消石灰の効果

1. 高病原性鳥インフルエンザに対する消毒効果
2. ネズミなどの野生動物に忌避効果あり

## (1) 人・車輛等による侵入の防止

- ・農場出入口：外来者の出入りを監視したり、外来車輛の消毒等を確認しましょう。
- ・鶏舎出入口：外来者の出入りは最小限度とした上で、衛生的な区画と非衛生的な区画を分離しましょう。衣服等に伝播するのを防止できる構造にしましょう。
- ・鶏舎内：踏込消毒槽と手指消毒用手押し式消毒器または消毒薬噴霧器を設置しましょう。


気温が低い時期の消毒薬の効果が下がります  
有効希釈倍率を調べて使用しましょう



## (2) 野鳥・野生動物による侵入の防止

- ・鶏舎には2cm角以下の網目の防鳥ネットを上から覆うように、ゆったりと垂らすように張り、間隙を塞ぎましょう。また、破損が見つかったら、直ちに補修しましょう。
- ・防鳥対策と同様、間隙を塞ぎ、ネズミの侵入を防止しましょう。
- ・ネズミを見つけた場合、その侵入経路を見つけ、捕獲装置の設置、殺鼠剤の使用により駆除しましょう。
- ・鶏舎周辺、農場敷地周縁及び農場内道路へ消石灰を散布しましょう。
- ・鶏舎の中に入ったら、すぐに扉を閉めましょう。

防鳥ネットを設置しましょう



## (3) 飲用水・飼料の汚染による侵入の防止

- ・新鮮な水道水を使いましょう。(貯留したままにすると塩素濃度が低下します。)
- ・水道水以外を使用する際には、鶏が飲む時に遊離塩素濃度が0.1ppm以上含まれるように調整を行い、濃度は定期的に確認しましょう。
- ・飼料タンク付近にこぼれ餌がないよう、常に清潔を保ちましょう。
- ・倉庫等は、鶏舎と同様に野鳥等の侵入防止及びネズミの駆除を徹底しましょう。

新鮮な水道水を使用しましょう

