

2018年9月BLASTAMによるいもち病の発病条件

病害虫防除所

	岐阜	大垣	愛知	西尾	海津	閑原	揖斐川	樽見	根尾	美濃	八幡	長瀬	白川	黒川	多治見	中津川	恵那	萩原	宮地	下呂	金山	高山	白川村	六厩莊川	宮之前朝日	河合	神岡	柄尾上宝
日付																												
9/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▲	◎	—	◎	▲	◎	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
9/3	—	—	—	—	—	—	—	▲	—	◎	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	
9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	▲	—	—	—	—	▲	—	—	—	—	●	—	—	—	△	—	—	—	—	
9/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	◎	—	—	
9/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	—	—	
9/9	▲	▲	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	▲	●	●	—	—	—	—	●	—	◎	—	—	◎	△	
9/10	—	▲	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	

凡例 △ : 準好適条件 ( 濡潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は20°C未満)

▲ : 準好適条件 ( 濡潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は25°C以上)

○ : 準好適条件 ( 濡潤時間10時間以上だが、濡潤期間の平均気温は15~25°Cの範囲外)

◎ : 準好適条件 ( 濡潤期間が濡潤時間中の平均気温ごとの必要な時間より短い)

● : 好適条件 ( 濡潤時間中の平均気温が15°C~25°C であり、濡潤時間が濡潤時間中の平均気温ごとに必要な時間を満たし、当日を含めてその日以前5日間の日平均気温の平均値が20°C~25 °Cの範囲にある)

— : 好適条件、準好適条件は満たされなかった

空白 : 欠測値があるため判定不能

\*感染好適条件が現れると感染し、潜伏期間（5~10日）を経て発病します。