

令和 3 年 1 0 月 1 2 日

岐阜県病害虫防除所

コナジラミ類(タバコナジラミ)の施設内への侵入に注意

西濃地域のトマト施設外に設置した黄色粘着板へのコナジラミ類誘殺数（9／Ⅳ～9／Ⅵ半旬累計）は平年の約 1.4 倍と多くなっています（図）。また、施設内に設置した黄色粘着板へのコナジラミ類誘殺数が平年より多いハウスもあり、トマト黄化葉巻病の発生も確認されています。

名古屋地方気象台の 1 か月予報（1 0 月 7 日発表）では気温は高いと予想され、コナジラミ類の発生が増加する可能性があります。

タバココナジラミは、トマト黄化葉巻病、トマト黄化病、キュウリ退緑黄化病のウイルスを媒介しますので、防虫ネットの隙間や破損がないかを確認する等、侵入防止対策を強化するとともに、防除対策を実施して下さい。




図 施設外の黄色粘着板におけるコナジラミ類誘殺数の推移（海津市日原）

- ・農薬の使用にあたっては、最新の登録内容を確認し、適正に使用してください。
農薬登録情報提供システム (<https://pesticide.maff.go.jp/>)
- ・当所のホームページに発生予察情報、病害虫調査データなどを掲載していますので
ご活用下さい。岐阜県病害虫防除所 (<https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/24321/>)