

埼玉県の家きん農場で 高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認 (今シーズン国内3例目)

【農場概要】

所在地 埼玉県毛呂山町
飼養状況 約4万5千羽(採卵鶏)

【経緯】

11月29日 死亡羽数増加の通報を受け、立入検査
簡易検査陽性
11月30日 遺伝子検査でHPAIの疑似患畜を確認

富山県魚津市11/21回収死亡野鳥(ヒドリガモ) H5亜型HPAI確認！

野鳥は1道8県(通算38例)で確認(11月30日時点環境省HP)

HPAI発生予防のポイント

- ・農場に出入りする全ての人・車両・物品は衛生対策
- ・衛生管理区域・家きん舎ごとに専用の長靴を着用
- ・野鳥及び野生動物の侵入防止対策

...普段は目が届きにくい場所にも注意を！

別添リーフレット参照

早期発見・早期通報の徹底をお願いします

通報先は、岐阜県中央家畜保健衛生所

電話：058-201-0530 時間外・夜間・休日：090-7024-5269

高病原性鳥インフルエンザ

発生予防のポイント

01

農場に入る全ての
人・車両・物品は衛生対策

作業員や外部事業者等を含め、衛生管理区域と家きん舎に入る人は衛生対策を徹底。車両も入場前の洗浄・消毒を必ず実施。物品は原則農場専用。やむを得ず持ち込む場合は洗浄・消毒を忘れない。



周囲にはウイルスがあると認識。
農場内・家きん舎内には入れない。



02

衛生管理区域・家きん舎ごとに
専用の長靴を着用

農場に入るとき、家きん舎に入るときは、必ず衛生的な長靴に交換。農場内では専用の衣服を着用。



着替え・履き替えの前後で
交差しないよう境界を明確に。



03

ウイルスを媒介する
野生動物の侵入防止対策

家きん舎は定期点検し、防鳥ネットや壁等の破損などはすぐに修繕。目の届きにくい屋根裏や入気口も注意が必要。



「農場に近寄らせない」
「農場内に入れない」
「ネズミ・ハエ等の定期的な駆除」



飼養家きんの異状を見つけた場合は、最寄りの家畜保健衛生所に連絡。

岐阜県中央家畜保健衛生所

TEL 058-201-0530 (時間外・夜間 090-7024-5269)

農林水産省HP
「鳥インフルエンザに関する情報」→



農場付近の水場は水抜き、
忌避テープの設置等により、
野鳥を寄せ付けない工夫を。



長靴は洗浄してから消毒の徹底。
消毒薬は定期的、または汚れた
都度交換。

農場の


重点対策



集卵コンベアなどの開口部の
隙間を塞ぐ。
普段目の届きにくい屋根裏や
入気口も点検し、破損があれば
補修。




農場辺縁を含め
敷地内の草刈り
や枝の剪定を行
い、野生動物が
隠れる場所を作
らない。



車両の消毒の徹底。
車体、タイヤ周りや溝の
汚れをしっかりとす。



洗浄・消毒された衛生的な衣服
や長靴を用意。



着替え、履き替え
の前後で動線が交
差しないよう境界
を明確に。

— 例外を作らずに必ず実施することが大切です。 —