

	岐阜	大垣	愛西 海津	関ヶ 原	揖斐 川	樽見 根尾	美濃	八幡	長滝 白鳥	美濃 加茂	黒川 白川	多治 見	中津 川	恵那	萩原	宮地 下呂	金山	高山	白川 村	六所 荘川	宮之 前朝日	河合	神岡	栃尾 上宝
日付																								
9/1	-	-	-	-	▲	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9/3	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
9/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	▲	-	-	-	-	-	-	-	-
9/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

凡例 △：準好適条件（湿潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は20℃未満）
▲：準好適条件（湿潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は25℃以上）
○：準好適条件（湿潤時間10時間以上だが、湿潤期間の平均気温は15～25℃の範囲外）
◎：準好適条件（湿潤期間が湿潤時間中の平均気温ごとの必要な時間より短い）
●：好適条件（湿潤時間中の平均気温が15℃～25℃であり、湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間を満たし、当日を含めてその日以前5日間の日平均気温の平均値が20℃～25℃の範囲にある）
－：好適条件、準好適条件は満たされなかった
空白：欠測値があるため判定不能
＊感染好適条件が現れると感染し、潜伏期間（5～10日）を経て発病します。