

令和 7 年 3 月 4 日
岐阜県病虫害防除所

チャバネアオカメムシの越冬状況について

県下 11 地点のチャバネアオカメムシ越冬成虫数は、1.7 頭（平年 0.9 頭）で平年の約 2 倍多く、捕獲地点率は 72.7%（平年 42.2%）で、過去 10 年間で 2 番目に多い状況です（表）。

チャバネアオカメムシは、越冬成虫数が多いと、7 月末までに果樹園へ飛来する成虫数が増える傾向があり、今後の発生動向には十分注意が必要です。

なお、今年の調査では、近年、果樹類で問題となっているツヤアオカメムシなどの越冬が同時に確認されたことから、これらカメムシ類の発生動向についても今後の情報に注意してください。

表 チャバネアオカメムシ越冬量調査結果

（調査時期：令和 7 年 2 月）

調査年度		R6	平年	R5	R4	R3	R2	R元	H30	H29	H28	H27	H26
調査場所													
岐阜市	東秋沢	2	0.6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	彦坂川南	1	0.3	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
海津市	南濃町奥条	5	0.9	0	0	0	0	6	0	0	0	1	2
	牛洞	0	0.3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
本巣市	法林寺	0	0.3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
美濃市	曾代	1	1.9	2	0.5	0	1	5	3	1	3	4	0
美濃加茂市	山之上西洞	2	1.6	2	0.9	1.3	0	7	0.5	0	1	1	2
	山之上中之番	1	1.5	3	0	0	0	8	1	0	1	2	0
中津川市	落合	0	0.1	0	0.3	0	0	0	0	1	0	0	0
	阿木	2	1.3	6	0.8	2	0.5	0	2	0	0	0	2
恵那市	武並	5	—	19	0	1	0	3	3	—	—	—	—
平均		1.7	0.9	3.0	0.3	0.5	0.1	3.5	0.9	0.3	0.5	0.9	0.6

調査地点 1 カ所あたり 50L の落葉を採取し、ハンドソーティングにより調査

- ・農薬の使用にあたっては、最新の登録内容を確認し、適正に使用してください。
農薬登録情報提供システム <https://pesticide.maff.go.jp/>
- ・当所のホームページに発生予察情報、病虫害調査データなどを掲載していますので
ご活用ください。
岐阜県病虫害防除所 <https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/24321/>