

2026年8月BLASTAMによるいもち病の発病条件

病虫害防除所

日付	岐阜	大垣	愛西 海津	関ヶ 原	揖斐 川	樽見 根尾	美濃	八幡	長滝 白鳥	美濃 加茂	黒川 白川	多治 見	中津 川	恵那	萩原	宮地 下呂	金山	高山	白川 村	六所 荘川	宮之 前朝日	河合	神岡	栃尾 上宝
8/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/4	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	-	-	▲	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●
8/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	-	-	▲	-	-	▲	-	-	-	-	-	-	-
8/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	-	-	▲	-	●
8/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	-	▲	-	-	-	-	●
8/9	-	-	-	-	-	▲	-	-	-	○	-	▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	-	-	-	-	-
8/13	-	▲	▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-
8/14	-	-	-	-	-	-	▲	●	-	-	●	-	-	-	-	●	▲	◎	◎	-	●	-	-	-
8/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	▲	-	-	-	-	-	-	-
8/16	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	△	-	●	-	●
8/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/18	-	-	-	-	-	-	▲	▲	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	-	-	-	-	-	-	-
8/19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/20	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	-	-	-	-	-	-
8/21	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	▲	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
8/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	-	▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/24	-	-	-	-	-	-	-	▲	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
8/25	-	-	-	-	-	-	-	▲	-	-	-	-	▲	▲	-	●	▲	-	-	-	-	-	▲	-
8/26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/27	-	-	-	-	-	-	○	-	▲	-	●	○	-	-	-	-	▲	▲	-	-	-	-	-	-
8/28	-	-	-	-	-	-	▲	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-
8/29	○	○	-	○	○	-	○	▲	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎	-	-	-
8/30	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	▲	▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

凡例 △ : 準好適条件 (湿潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は20℃未満)

▲ : 準好適条件 (湿潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は25℃以上)

○ : 準好適条件 (湿潤時間10時間以上だが、湿潤期間の平均気温は15～25℃の範囲外)

◎ : 準好適条件 (湿潤期間が湿潤時間中の平均気温ごとの必要な時間より短い)

● : 好適条件 (湿潤時間中の平均気温が15℃～25℃ であり、湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間を満たし、当日を含めてその日以前5日間の日平均気温の平均値が20℃～25℃の範囲にある)

— : 好適条件、準好適条件は満たされなかった

空白 : 欠測値があるため判定不能

*感染好適条件が現れると感染し、潜伏期間 (5～10日) を経て発病します。