


年末年始・春節 防疫対策の徹底！！

近隣諸国で口蹄疫が継続発生中です

発生地域への渡航の自粛をお願いいたします

中国、香港、台湾、韓国、北朝鮮、モンゴル、ロシアにおける口蹄疫の発生状況（2013年1月以降の発生）




2015年12月21日現在

※ 出典：OIE ほか
 ※ 日付は発生日(各々の事例が初めて観察された日)
 ※ ロシアは極東ロシア及びザバイカリエ地方に限る

韓国における口蹄疫の発生状況 (2014年7月23日～、O型)

2015年7月23日現在



「衛生管理区域への病原体持ち込み防止」の再確認

- ✓ 必要のない人を立ち入らせない
- ✓ 洗浄・消毒の徹底(靴、車、物品)

効果的な消毒を実施しましょう！

- ◎ 効果的な消毒のポイント
- ・ 踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れてしまうことから、**まずは汚れを落としてから消毒**すること。また、**消毒薬が汚れていることに気づいたら、直ちに交換**すること。
 - ・ 農場に出入りする車両の消毒では、タイヤのみを消毒するのではなく、**泥よけの内側部分や運転席の足元スペース**も可能な限り消毒すること。



＜要注意＞


- ★ **逆石けんは口蹄疫の消毒薬としては不適です！**
- ★ 消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**

🐮 消石灰を散布しましょう！

- (1) 使用場所
 - ・ 農場内の外部車両が停車する場所
 - ・ 畜舎周囲・農場外縁部
- (2) 使用方法
 - ・ 0.5～1kg/m²を目安にホウキ等で均一に広げる(20～40m²当たり消石灰1袋20kg)
 - ・ 地面の表面がムラなく白くなる程度



【畜舎周囲・農場外縁部での散布のイメージ】



農場の出入り口には幅3m×長さ7m以上(車の散布タイヤが一周する程度)散布する

- 注意)
- 塩素系消毒剤(ビルコン・クレンテ等)の入った踏込消毒槽に消石灰の付いた長靴で入ると効果が落ちるので、石灰がついたまま入らないこと！
 - 酸は塩素系消毒剤と混ぜると塩素ガスが発生し危険です！！

【参考】口蹄疫ウイルスに効果があるとされている消毒薬

分類	商品名	効果が認められる最高希釈倍数(注)
ヨウ素系消毒薬	クリンナップA	400倍
	ファインホール	400倍
	バイオシッド30	1,000倍
塩素系消毒薬	アンテックビルコンS	2,000倍
	クレンテ	2,000倍
	スミクロール	1,000倍
アルデヒド系消毒薬	グルタクリーン	800倍
複合消毒薬	アリバンド	400倍
NaOH添加消毒薬	クリアキル-100(NaOH添加)	2,000倍



帰国後の留意事項

- ✓ 肉製品等を持ち帰らない
- ✓ 帰国の際は動物検疫所に立ち寄る
- ✓ 帰国後1週間は衛生管理区域に立ち入らない
- ✓ 海外で使用した衣服や靴を持ち込まない

年末年始も異常を認めた場合は家畜保健衛生所に連絡してください

☎ 0574-25-3111

閉庁時は案内に従い「1」番をプッシュしてくださいつながらない場合は 0574-25-3484
土日・祝日、閉庁時も通報を受け付けます

中濃家畜保健衛生所

TEL 0574-25-3111 FAX 0574-27-3092